

**ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ**  
**ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ**  
**Β' ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ**  
**2002**

**ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ**

**ΘΕΜΑ 1ο**

**A1.** Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν τραπεζίου ισούται με το γινόμενο του ημισυμφορματισμού των βάσεων του επί το ύψος του.

**Μονάδες 10**

**A2.** Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη "**Σωστό**" ή "**Λάθος**" δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση.

**α.** Το P είναι εξωτερικό σημείο του κύκλου (O, R), αν και μόνο αν  $\Delta_{(O,R)}^P > 0$ , όπου  $\Delta_{(O,R)}^P$  η δύναμη του σημείου P ως προς τον κύκλο (O, R).

**Μονάδα 1**

**β.** Σε κάθε τρίγωνο ABΓ ισχύει η ισοδυναμία:

$$a^2 < b^2 + \gamma^2, \text{ αν και μόνο αν } \hat{A} < 90^\circ .$$

**Μονάδα 1**

**γ.** Το εμβαδόν E κάθε τριγώνου ABΓ δίνεται από τον τύπο  $E = \frac{1}{2} \alpha \beta \eta \mu B$ .

**Μονάδα 1**

**δ.** Σε κύκλο (O, R), το εμβαδόν E κυκλικού τομέα  $\mu^\circ$  δίνεται από τον τύπο  $E = \frac{\pi R^2 \mu}{180}$ .

**Μονάδα 1**

**ε.** Το 1ο θεώρημα των διαμέσων σε κάθε τρίγωνο ABΓ εκφράζεται από τον τύπο:  $\beta^2 + \gamma^2 = 2\alpha^2 + \frac{\mu_\alpha^2}{2}$ .

**Μονάδα 1**

**B. α.** Να εγγραφεί κανονικό εξάγωνο σε κύκλο (O, R) και να αποδείξετε ότι  $\lambda_6 = R$ , όπου  $\lambda_6$  η πλευρά του εξαγώνου.

**Μονάδες 6**

**β.** Να αποδείξετε ότι  $\alpha_6 = \frac{R\sqrt{3}}{2}$ , όπου  $\alpha_6$  το απόστημα του εξαγώνου.

**Μονάδες 4**

**ΘΕΜΑ 2ο**

Δίνεται τρίγωνο  $AB\Gamma$  με πλευρές  $a, \beta, \gamma$  και διάμεσο  $AM = \mu_a$ . Αν ισχύει η σχέση

$$2\mu_a^2 - \beta\gamma = \frac{a^2}{2},$$

α. να αποδείξετε ότι  $a^2 = \beta^2 + \gamma^2 - \beta\gamma$ ,


**Μονάδες 15**

β. να υπολογιστεί η γωνία  $\hat{A}$ .

**Μονάδες 10**

**ΘΕΜΑ 3ο**

Στο σχήμα που ακολουθεί, δίνεται κύκλος  $(O,R)$  διαμέτρου  $B\Gamma$  και ημιευθεία  $Bx$  τέτοια, ώστε η γωνία  $\Gamma Bx$  να είναι  $30^\circ$ . Έστω ότι η  $Bx$  τέμνει τον κύκλο στο σημείο  $A$ . Φέρουμε την εφαπτομένη του κύκλου στο  $\Gamma$ , η οποία τέμνει τη  $Bx$  στο σημείο  $P$ .



Να αποδείξετε ότι:

α.  $A\Gamma = R$ .

**Μονάδες 5**

β.  $\frac{(PB\Gamma)}{(PA\Gamma)} = 4$ .


**Μονάδες 10**

γ.  $P\Gamma = \frac{2R\sqrt{3}}{3}$ .

**Μονάδες 10**

**ΘΕΜΑ 4ο**

Στο σχήμα που ακολουθεί, σε τετράγωνο  $AB\Gamma\Delta$  πλευράς 7 cm, εγγράφουμε τετράγωνο  $EZH\Theta$  έτσι, ώστε:  
 $AE = BZ = \Gamma H = \Delta\Theta = 3$  cm.



- α.** Να βρεθεί το εμβαδόν του τετραγώνου  $EZH\Theta$ . **Μονάδες 5**
- β.** Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου  $EBZ$  και να αποδείξετε ότι η ακτίνα του εγγεγραμμένου κύκλου  $(\Lambda, \rho)$  στο τρίγωνο  $EBZ$  είναι  $\rho = 1$  cm. **Μονάδες 12**
- γ.** Εάν  $(K, R)$  είναι ο εγγεγραμμένος κύκλος στο τετράγωνο  $EZH\Theta$ , να υπολογίσετε το λόγο του εμβαδού του κύκλου  $(K, R)$  προς το εμβαδόν του κύκλου  $(\Lambda, \rho)$ . **Μονάδες 8**

## ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

### ΘΕΜΑ 1ο

**A.1.** Θεωρία, θεώρημα IV σελ. 214 σχολ. βιβλίου.

**A.2.**

$\alpha$	$\Sigma$
$\beta$	$\Sigma$
$\gamma$	$\wedge$
$\delta$	$\wedge$
$\epsilon$	$\wedge$

**B.** Θεωρία σελ. 238 σχολ. βιβλίου.

### ΘΕΜΑ 2ο

**α.** Από το πρώτο θεώρημα διαμέσων έχουμε:

$$\beta^2 + \gamma^2 = 2\mu_\alpha^2 + \frac{\alpha^2}{2} \Leftrightarrow 2\mu_\alpha^2 = \beta^2 + \gamma^2 - \frac{\alpha^2}{2}.$$

Έτσι η δοσμένη σχέση  $2\mu_\alpha^2 - \beta\gamma = \frac{\alpha^2}{2}$  γράφεται:

$$\beta^2 + \gamma^2 - \frac{\alpha^2}{2} - \beta\gamma = \frac{\alpha^2}{2} \Leftrightarrow \beta^2 + \gamma^2 - \beta\gamma = \alpha^2.$$

**β.** Από το νόμο των συνημιτόνων έχουμε:

$$\alpha^2 = \beta^2 + \gamma^2 - 2\beta\gamma \text{ συν}A.$$

Λόγω της σχέσης  $\alpha^2 = \beta^2 + \gamma^2 - \beta\gamma$  του (α) ερωτήματος προκύπτει:

$$2\text{συν}A = 1 \Leftrightarrow \text{συν}A = \frac{1}{2}.$$

Άρα η γωνία A είναι  $60^\circ$ .

### ΘΕΜΑ 3ο

**α.** Στο εγγεγραμμένο στον κύκλο τρίγωνο  $\overset{\Delta}{\text{ΑΒΓ}}$  η γωνία  $\hat{\text{Α}}$  είναι  $90^\circ$ , ως εγγεγραμμένη που βαίνει σε ημικύκλιο.

Επομένως το τρίγωνο  $\overset{\Delta}{\text{ΑΒΓ}}$  είναι ορθογώνιο στο Α.

Επειδή η γωνία  $\hat{\text{Β}} = 30^\circ$ , προκύπτει από γνωστό θεώρημα ότι:

$$\text{ΑΓ} = \frac{\text{ΒΓ}}{2} = \frac{2\text{R}}{2} = \text{R}.$$

**β.** Το τρίγωνο  $\overset{\Delta}{\text{ΒΓΡ}}$  είναι ορθογώνιο στο Γ, αφού ΓΡ εφαπτόμενη στον κύκλο, στο σημείο Γ.

Τα τρίγωνα  $\triangle P\hat{B}\Gamma$  και  $\triangle P\hat{\Gamma}A$  είναι όμοια γιατί είναι ορθογώνια και έχουν την  $\hat{P}$  κοινή γωνία.

Επομένως:

$$\frac{(PB\Gamma)}{(PA\Gamma)} = \lambda^2, \text{ όπου } \lambda \text{ ο λόγος ομοιότητας των τριγώνων.}$$

Όμως  $\lambda = \frac{B\Gamma}{A\Gamma} = \frac{2R}{R} = 2.$

Οπότε  $\frac{(PB\Gamma)}{(PA\Gamma)} = 2^2 = 4.$

**γ.** Από το ορθογώνιο τρίγωνο  $\triangle AB\Gamma$  έχουμε:

$$AB^2 = B\Gamma^2 - A\Gamma^2$$

οπότε

$$AB^2 = (2R)^2 - R^2 = 3R^2$$

Άρα

$$AB = R\sqrt{3} \quad (1)$$

Στο ορθογώνιο τρίγωνο  $\triangle B\hat{\Gamma}P$  έχουμε:

$$A\Gamma \perp BP$$

Επομένως

$$A\Gamma^2 = AB \cdot AP$$

οπότε

$$R^2 = R\sqrt{3} \cdot AP \quad \text{ή}$$

$$AP = \frac{R^2}{R\sqrt{3}} = \frac{R\sqrt{3}}{3} \quad (2)$$

Ακόμα στο ορθογώνιο τρίγωνο  $\triangle A\hat{P}\Gamma$  έχουμε  $P = 60^\circ$ ,

οπότε  $A\hat{\Gamma}P = 30^\circ$ . Επομένως  $P\Gamma = 2AP$

και λόγω της (2) προκύπτει ότι  $P\Gamma = \frac{2R\sqrt{3}}{3}$ .

## ΘΕΜΑ 4ο

**α.** Η πλευρά  $a$  του τετραγώνου  $EZH\Theta$  είναι υποτείνουσα ορθογωνίου τριγώνου με κάθετες πλευρές  $3\text{cm}$  και  $4\text{cm}$ . Έτσι:

$$a^2 = 3^2 + 4^2 \Leftrightarrow a^2 = 25\text{cm}^2 \Leftrightarrow a = 5\text{cm}.$$

Το εμβαδόν του  $EZH\Theta$  είναι  $25\text{cm}^2$ .

**β.**  $(EBZ) = \frac{EB \cdot ZB}{2} = \frac{4 \cdot 3}{2} = 6\text{cm}^2.$

Όμως είναι και  $(EBZ) = \rho \cdot \tau$  όπου  $\tau = \frac{3+4+5}{2} = 6\text{cm}$ . Έτσι:

$$6 \bullet \rho = 6 \text{ \AA} \text{ \rho} = 1 \text{ cm.}$$

**\u03b3.** \u0395\u03b9\u03bd\u03b1\u03b9  $R = \frac{5}{2}$  cm \u03ba\u03b9  $\rho = 1$  cm, \u03c9\u03c0\u03c4\u03b5 \u03c9 \u03b6\u03b7\u03c4\u03cc\u03bc\u03b5\u03bd\u03cc\u03c2 \u03bb\u03cc\u03b3\u03cc\u03c2 \u03b9\u03c3\u03cc\u03c5\u03b1\u03b9 \u03bc\u03b5:

$$\frac{\pi R^2}{\pi \rho^2} = \left(\frac{R}{\rho}\right)^2 = \left(\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{25}{4}.$$